

*CATALOGUE DES TYPES DE POISSONS  
DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE  
NATURELLE.*

*Familles des Triacanthidae, Balistidae, Monacanthidae  
et Aluteridae.*

Par Y. LE DANOIS.

Les Collections du Muséum contiennent un très grand nombre de types de ces familles, qui ont été étudiés et déterminés notamment par CUVIER, QUOY et GALMARD, LESSON, VALENCIENNES, HOLLARD, BLEEKER et CASTELNAU. Elles proviennent de toutes les mers tropicales et ont été recueillies par les naturalistes qui effectuaient de longues croisières au temps de la marine à voiles. On y trouve même quelques échantillons particulièrement vénérables car LACÉPÈDE les a décrits quand il les reçut de COMMERSON qui les avait récoltés au cours des expéditions de BOUGAINVILLE. Parmi les savants navigateurs qui ont figuré et nommé des espèces, certains, comme PÉRON, n'ont pas eu le temps, au retour de leurs voyages, avant de mourir des suites de leurs fatigues ou des maladies contractées dans les mers lointaines, de publier le résultat de leurs découvertes. Il n'en reste que les Poissons mêmes qu'ils avaient conservés, des dessins et quelques lignes dans des manuscrits de l'incomparable bibliothèque du Muséum. Nous devons exprimer notre gratitude à M<sup>lle</sup> M. G. MADIER de nous avoir guidé dans la recherche de ces documents inédits.

Pour le classement nous avons suivi en général les ouvrages de BLEEKER (1868-1877) et de FRASER-BRUNNER (1941).

\*  
\* \*

Famille des TRIACANTHIDAE.

Genre *Pseudotriacanthus* Fraser-Brunner, 1941.

*Triacanthus longirostris* Hollard, 1834, Monogr. Balistides. *Ann. Sc. Nat.*  
4<sup>e</sup> sér. Zool. T. I, p. 46, pl. II, fig. 3.

= *Pseudotriacanthus strigilifer* (Cantor, 1849).

A. 8478. — Holotype figuré.

Mers des Indes.

260 mm, monté, bon état.

Genre *Triacanthus* Cuvier, 1829.

*Triacanthus oxycephalus* Bleeker, 1852, Balistidae. *Verh. Bat. Gen.* XXIV, p. 27 (ex parte) pl. V, fig. 10.

= *Triacanthus biaculeatus* (Bloch, 1787).

3018. — Paratype.

Batavia. — BLEEKER.

2 sp., 102-120 mm, alcool, bon état.

*Triacanthus Russellii* Bleeker, 1852, Balistidae. *Verh. Bat. Gen.* XXIV, p. 25.

= *Triacanthus brevirostris* Temminck & Schlegel, 1842.

B. 2070. — Paratype.

Célèbes (Macassar). — BLEEKER.

195 mm, alcool, bon état.

*Triacanthus Nieuhofi* Bleeker, 1852, Balistidae, *Verh. Bat. Gen.* XXIV, p. 26, pl. IV, fig. 9.

5873. — Paratype.

Sumatra occidental. — BLEEKER.

105 mm, alcool, bon état.

*Triacanthus brachysoma* Bleeker, 1853, *Derde bijdrage ichthyol. fauna Amboina. Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* IV, p. 128.

= *Triacanthus Nieuhofi* Bleeker, 1832.

a) 3015. — Paratype.

Célèbes. — BLEEKER.

65 mm, alcool, bon état.

b) 3017. — Paratype.

Nias. — BLEEKER.

96 mm, alcool, mauvais état.

*Triacanthus angustifrons* Hollard, 1854, *Monogr. Balistides. Ann. Sc. Nat.*, 4<sup>e</sup> sér. Zool. T. I., p. 45, pl. 11, fig. 2.

= *Triacanthus biaculeatus* (Bloch, 1787).

B. 2074. — Holotype figuré.

Mers des Indes. — Voyage de PÉRON.

95 mm, alcool, mauvais état (seulement la partie antérieure du corps).

\* \* \*

Famille des BALISTIDAE.

Genre *Abalistes* Jordan & Seale, 1906.

*Balistes stellatus* Rüppel, 1826, *Atlas Nord. Afr. Zool. Fische Roth. Meer.*, p. 31.

= *Abalistes stellaris* (Bloch, Schneider, 1801).

B. 1925. — Holotype.

Mer Rouge. — RÜPPEL.

160 mm, alcool, assez bon état.

Genre *Balistes* Linné, 1758.

*Balistes caprinus* Valenciennes, 1833, Ichth. Iles Canaries. Webb et Berthelot, p. 94, pl. XVI, fig. 3.

= *Balistes capriscus* Linné, 1758.

B. 1872. — Holotype figuré.

Iles Canaries. — WEBB et BERTHELOT.

350 mm, alcool, bon état.

*Balistes dichrostigma* Guichenot, MSS. Bibliothèque du Muséum de Paris.

= *Balistes forcipatus* Gmelin, 1788.

B. 1825. — Holotype.

Gorée. — LESUEUR.

292 mm, alcool, bon état.

Genre *Pseudobalistes* Bleeker, 1865.

le *Baliste verdâtre* Lacépède, 1798, Hist. Nat. Poissons. T. I, p. 378, pl. 16, fig. 3.

= *Pseudobalistes viridescens* Bloch, Schneider, 1801.

A. 8516. — Holotype figuré.

Ile Maurice. — COMMERSON.

564 mm, monté, bon état.

« L'individu observé par COMMERSON, et qui était femelle, contenoit des milliers d'œufs ; et cette femelle étoit ainsi au mois de janvier, dans la mer qui baigne l'Isle de France... » (LACÉPÈDE).

*Balistes reticulatus* Hollard, 1854, Monogr. Balistides. *Ann. Sc. Nat.*, 4<sup>e</sup> sér. T. I, p. 312.

= *Pseudobalistes fuscus* (Bloch. Schneider, 1801).

a) B. 1877. — Holotype.

Tonga-Tabou.

203 mm, alcool, assez bon état.

b) A. 8509. — Syntype.

Ile de la Réunion.

308 mm, monté, bon état.

*Balistes Garnoti* Castelnau, 1873, Contribution to the Ichthyology of Australia. *Proc. Zool. Acclim. Soc. Victoria*, vol. II, n<sup>o</sup> VI, Notes on fishes from Knob Island., p. 107.

= *Pseudobalistes fuscus* (Bloch. Schneider, 1801).

B. 1934. — Holotype.

Noble-Island. — CASTELNAU (1877).

39 mm, alcool, bon état.

L'étiquette de la main de CASTELNAU portait : *Balistes Lessonii*, alors que la description de ce même poisson publiée dans l'Ichthyologie d'Australie a pour désignation : *Balistes Garnoti*. Le naturaliste semble avoir mis par erreur sur l'étiquette le nom de LESSON alors qu'il avait dédié l'espèce à GARNOT, son compagnon de voyage sur la *Coquille*.

Genre *Balistapus* Tilesius, 1820.

le *Baliste américain* Lacépède, 1798, Hist. Nat. Poisson. T. I, p. 376, pl. AY, fig. 2.

= *Balistapus conspicillum* (Bloch, Schneider, 1801).

A. 8496. — Holotype figuré.

Origine inconnue. — Ancienne Collection.

320 mm, monté, bon état.

« *Balistes nigricans* ; rostro, maculis, pinnis pectoris, dorsi, ani, dimidiaque cauda, exalbidis ; triplice aculeorum serie ad caudam. » (COMMERSON, MSS.)

le *Baliste armé* Lacépède, 1798, Hist. Nat. Poissons. T. I, p. 382, pl. 18, fig. 2.

= *Balistapus armatus* (Bloch, Schneider, 1801).

A. 8542. — Holotype.

Mers des Indes. — COMMERSON.

192 mm, exemplaire desséché et fendu.

« *Balistes sextuplici aculeorum ordine ad caudam utrinque, cauda margine extremo et lateribus alba.* » (COMMERSON, MSS.)

*Balistes praslénensis* Quoy & Gaimard, 1824, Voy. de l'Uranie et de la Physicienne. Zool. Part. II, Poissons. P. 205, Tab. 46, fig. L.

= *Balistes praslensis* Hollard, 1854, Monogr. Balistides. Ann. Sc. Nat. 4<sup>e</sup> ser., Zool. T. I, p. 332.

= *Balistapus verrucosus* (Linné, 1758).

a) B. 1769. — Holotype figuré de QUOY & GAIMARD, Paratype de HOLLARD.

Ile Waigiou (Nouvelle-Guinée). — QUOY et GAIMARD (1820).

142 mm, alcool, mauvais état.

« Notre individu, dessiné sur le vivant par M. TAUNAY, provient de l'île Waigiou... » (QUOY et GAIMARD).

b) B. 1770. — Paratype.

Ile Timor. — QUOY et GAIMARD (1820).

195 mm, alcool, assez bon état.

*Balistes medinilla* Quoy & Gaimard, 1824, Voy. Uranie, Zool. Part. II, Poissons, p. 206, pl. 46, fig. 2.

= *Balistapus rectangulus* (Bloch, Schneider, 1801).

B. 1789. — Paratype.

Ile Vanikoro. — QUOY et GAIMARD (1820).

168 mm, alcool, bon état.

« Nous dédions ce baliste à Don Joseph de Medinilla y Pineda, Gouverneur des îles Mariannes, en reconnaissance de l'accueil si obligeant et si généreux que notre expédition et nous tous en particulier avons reçu de lui... » (QUOY et GAIMARD).

*Balistes Lamourouxii* Quoy & Gaimard, 1824, Voy. de l'Uranie et Physicienne. Zool. Part. II, Poissons, p. 208, pl. 47, fig. L.

= *Balistapus undulatus* (Mungo Park, 1797).

B. 1777. — Paratype.

Tonga Tabou. — QUOY et GAIMARD (1820).

130 mm, alcool, bon état.

Étudié par H. Hollard, comme variété *monochrome* de *Balistes lineatus* (BL. SCH.).

*Baliste du Grand Océan*. LESSON, 1830. Voy. Coquille. Zool. T. II, p. 113, Tab. 9, fig. 1.

= *Balistapus conspicillum* (Bloch. Schneider, 1801).

B. 1865. — Holotype figuré.

Iles Carolines. — LESSON et GARNOT.

295 mm, alcool, bon état.

*Balistes praslinoïdes*, *Baliste praslinoïde* LESSON, 1830. Voy. Coquille, Zool. T. II, p. 117, Pl. 9, fig. 3.

*Balistes praslensis* Hollard, 1854, Monogr. Balistides. Ann. Sc. Nat., 4<sup>e</sup> sér. Zool., T. I, p. 332.

= *Balistapus verrucosus* (Linné, 1758).

a) B. 1771. — Holotype figuré de LESSON.

Paratype de HOLLARD.

Port-Praslin (Nouvelle-Irlande). — LESSON et GARNOT.

145 mm, alcool, assez bon état.

b) B. 1768. — Holotype de HOLLARD,

Paratype de LESSON.

Ile Waigiou (Nouvelle Guinée). — LESSON et GARNOT.

202 mm, alcool, bon état.

*Balistes ornatissimus* LESSON, 1830, Voy. Coquille, Zool. T. II, p. 119, Pl. 10, fig. 1.

= *Balistapus aculeatus* (Linné, 1758).

a) B. 1876. — Holotype figuré.

Bora-bora (Iles de la Société). — LESSON et GARNOT.

210 mm, alcool, bon état.

« Nous primes cette gracieuse espèce de poisson dans la baie de Beula, dans l'île de Borabora, de l'Archipel de la Société. » (LESSON).

b) B. 1802, B. 1796. — Paratypes.

Bora-bora (Iles de la Société). — LESSON et GARNOT.

111-178 mm, alcool, bon état.

c) B. 1800. — Paratype.

Ile Mauricc. — LESSON et GARNOT.

113 mm, alcool, bon état.

*Balistes erythropterus*, *Baliste à pectorale bordée de rouge* LESSON, 1830, Voy. Coquille. Zool. T. II, p. 123, Pl. 10, fig. 3.

= *Balistapus rectangulus* (Bloch. Schneider, 1801).

B. 1847. — 3154. — Syntypes.

Ile Waigiou (Nouvelle-Guinée). — LESSON et GARNOT.

152-174 mm, alcool, bon état.

*Balistes praslensis* Hollard, 1854, Monogr. Balistides. *Ann. Sc. Nat.*, 4<sup>e</sup> sér., Zool., t. I, p. 232.

= *Balistapus verrucosus* (Linné, 1758).

a) B. 1844, B. 1901. — Paratypes.

Mers des Indes.

58-80 mm, alcool, assez bon état.

b) A. 8537, A. 8539. — Paratypes.

Origine inconnue.

158-220 mm, montés, bon état.

Genre *Canthidermis* SWAINSON, 1839.

*Balistes angulosus* Quoy & Gaimard, 1824, Voy. Uranie et Physicienne Zool. Part. II, Poissons, p. 210.

= *Canthidermis maculatus* (Gmelin, 1788).

a) B. 1921. — Holotype.

Iles Hawaï. — QUOY et GAIMARD (1820).

83 mm, alcool, mauvais état.

b) B. 1804. — Paratype.

Iles Hawaï. — QUOY et GAIMARD.

55 mm, alcool, mauvais état.

c) B. 1869. — Paratype.

Ile Waïgiou (Nouvelle-Guinée). — QUOY et GAIMARD, 1820.

172 mm, alcool, mauvais état.

d) B. 1867. — Paratype.

Origine inconnue.

57 mm, alcool, mauvais état.

*Baliste noir et bleu*, *Balistes nigro-coeruleus* Quoy & Gaimard, MSS. Expédition Duperrey, Pl. 227, fig. 1, in MSS. CUVIER, Poissons Plectognathes (Balistes proprement dit, avec épines à la queue) MSS. n<sup>o</sup> 1754, Bibliothèque du Muséum de Paris.

= *Canthidermis maculatus* (Bloch, 1786).

B. 1858. — Holotype figuré.

Nouvelle-Guinée. — QUOY et GAIMARD, 1830.

201 mm, alcool, assez bon état.

« Il a été pris sur la côte Nord de la Nouvelle-Guinée, le 11 août 1827, près de l'Anse de l'Attaque, non loin de la Baie Mumbolo. » (QUOY et GAIMARD, MSS).

*Balistes azureus* Lesson, 1830, Voy. Coquille. Zool. T. II, p. 121, Pl. 10. fig. 2.

= *Canthidermis maculatus* (Bloch, 1786).

a) B. 1809. — Holotype figuré.

Nouvelle-Guinée. — LESSON et GARNOT.

150 mm, alcool, mauvais état.

b) A. 8520. — Paratype.

Bora-bora (Iles de la Société). — LESSON et GARNOT.

134 mm, monté, bon état.

*Balistes longissimus* Hollard, 1854, Monogr. Balistides. *Ann. Sc. Nat.*, 4<sup>e</sup> sér. T. I, p. 60, Pl. III, fig. 3.

= *Canthidermis maculatus* (Bloch, 1786).

B. 1806. — Holotype figuré.

Vanikoro. — QUOY et GAIMARD (1820).

412 mm, alcool, bon état.

Genre *Xantichthys* Kaup, 1856.

*Balistes lineo-punctatus* Hollard, 1854, Monogr. Balistides. *Ann. Sc. Nat.*, 4<sup>e</sup> sér., T. I, p. 65.

= *Xantichthys curassavicus* (Gmelin, 1768).

a) A. 8529. — Holotype.

Ile de la Réunion. — MOREL.

160 mm, monté, bon état.

b) 4071. — Paratype.

Ile de la Réunion. — MALAVOIS.

172 mm, alcool, très bon état.

*Balistes calolepis* Hollard, 1854, Monogr. Balistides. *Ann. Sc. Nat.*, 4<sup>e</sup> sér. T. I., p. 67, pl. III, fig. 5.

= *Xantichthys auromarginatus* (Bennett, 1829).

B. 1868. — Holotype figuré.

Ile Maurice. — LESSON et GARNOT.

193 mm, alcool, bon état.

Genre *Melichthys* Swainson, 1839.

le *Baliste silloné* Lacépède, 1798, Hist. Nat. Poissons. T. I, p. 370, Pl. 18, fig. 1.

= *Melichthys ringens* (Osbeck, 1763).

A. 8497. — Holotype figuré.

Mers des Indes. — COMMERSON.

345 mm., monté, assez bon état.

« *Balistes niger*, *linea alba dorsi*. » (COMMERSON, MSS).

\*  
\* \*

Famille des MONACANTHIDAE.

Genre *Pervagor* Whitley, 1930.

*Balistes melanotus* Péron, dessin MSS. in MSS. CUVIER, Poissons Plectognathes (Monacanthes à fanon extensible, sans épines à la queue). — N<sup>o</sup> 1754. Bibliothèque du Muséum de Paris.

= *Pervagor melanocephalus* (Bleeker, 1853).

B. 2024. — Holotype figuré.

Mers des Indes. — PÉRON et LESUEUR.

81 mm, alcool, assez bon état.

*Monacanthus aspricaudus* Hollard, 1854, Monogr. Balistides. *Ann. Sc. Nat.*, 4<sup>e</sup> sér. T. II, p. 330.

= *Pervagor melanocephalus* (Bleeker, 1853).

a) A. 8545. — Holotype.

Origine inconnue. — Ancienne Collection.

98 mm, naturalisé, mauvais état.

« Je donne à ce Monacanthus le nom que je lis sur l'étiquette d'un exemplaire sec, et qui paraît avoir été proposé par MM. Cuvier et Valenciennes. » (HOLLARD).

b) B. 1969. — Paratype.

Origine inconnue.

90 mm, alcool, mauvais état.

Genre *Paramonacanthus* Bleeker, 1865.

*Monacanthus choirocephalus* Bleeker, 1852, Balistidae, *Verh. Bat. Gen.* XXIV, p. 19, Pl. 2, fig. 4.

= *Paramonacanthus choirocephalus* Bleeker, 1852.

4788. — Paratypes.

Batavia. — BLEEKER (1857).

2 exempl., 72-76 mm, alcool, assez bon état.

*Monacanthus tricuspis* Hollard, 1854, Monogr. Balistides. *Ann. Sc. Nat.*, 4<sup>e</sup> sér. T. II, p. 351, pl. 13, fig. 3.

= *Paramonacanthus choirocephalus* Bleeker, 1852.

a) A. 4135. — Holotype figuré.

Mers des Indes (Bombay). — DUSSUMIER (1830).

66 mm, alcool, assez bon état.

b) A. 4134. — Paratype.

Mers des Indes. — PÉRON et LESUEUR.

70 mm, alcool, mauvais état.

Genre *Stephanolepis* Gill, 1861.

*Balistes Freycineti* Quoy & Gaimard, 1824, Voyage autour du monde des corvettes l'*Uranie* et la *Physicienne* (1817-1820). Zool. Part.

II., Poissons, p. 213.

= *Stephanolepis Freycineti* (Quoy & Gaimard, 1824).

a) A. 4100. Holotype.

Ile Maurice. QUOY et GAIMARD (1820).

222 mm, alcool, assez bon état.

« Ce poisson, que nous avons rapporté de l'île de France, a été dédié à M. Louis de Freycinet par M. Cuvier. » (QUOY et GAIMARD).

b) A. 4107, A. 4108. — Syntypes.

Port-Western (Nouvelles Galles du Sud). — QUOY et GAIMARD (1820).

205, 221, 245 mm, alcool, mauvais état.

c) B. 2037. — Paratype.

Australie. — QUOY et GAIMARD (1820).

155 mm, desséché, mauvais état.



*Monacanthus gallinula* Valenciennes, 1835, Ichthyol. Iles Canaries.  
Webb et Berthelot, p. 95.

= *Stephanolepis setifer* (Bennett, 1831).

B. 2003. — Holotypes.

Iles Canaries. — WEBB et BERTHELOT.

126, 132 mm, exemplaires desséchés et collés sur papier, assez bon état.

*Monacanthus filamentosus* Valenciennes, 1835, Ichthyol. Iles Canaries.  
Webb et Berthelot, p. 95, pl. 16, fig. 1.

= *Stephanolepis setifer* (Bennett, 1831).

a) 6326. — Holotype figuré.

Iles Canaries. — WEBB et BERTHELOT.

160 mm., alcool, mauvais état.

b) B. 1999. — Paratype.

Bahia. — LEMELLE-DEVILLE.

106 mm, alcool, mauvais état.

*Monacanthus prasinus* Castelnau, 1872, Contribution to the Ichthyology of Australia. *Proc. Zool. Soc. Vict.*, vol. I, p. 205.

= *Stephanolepis Freycineti* (Quoy et Gaimard, 1824).

a) B. 2053. — Holotype.

Melbourne. — CASTELNAU (1875).

53 mm, alcool, mauvais état.

b) A. 4562. — Paratype.

Melbourne. — CASTELNAU (1882).

101 mm, naturalisé, bon état.

Genre *Arotrolepis* Fraser-Brunner, 1941.

*Monacanthus sulcatus* Hollard, 1854, Monogr. Balistides, *Ann. Sc. Nat.*,  
4<sup>e</sup> sér., T. II, p. 363, pl. 14, fig. 3.

= *Arotrolepis sulcatus* (Hollard, 1854).

B. 1418. — Holotype figuré.

Macao. — EYDOUX et SOULEYET (1837).

72 mm, alcool, assez bon état.

Genre *Chaetodermis* Swainson, 1839.

*Balistes penicilligerus* Péron = *Monacanthus penicilligerus* Cuvier, 1817,  
Règne animal, ed. 1, pl. IX, fig. 3; — 1829, ed. II, T. II, p. 374 (en  
note 2).

= *Chaetodermis penicilligerus* (Cuvier, 1817).

B. 2026. — Holotypes figurés.

Mers de l'Australie. — PÉRON et LESUEUR.

6 exempl., 20-36 mm, alcool, mauvais état.

*Balistes Pellion* Quoy & Gaimard, 1824, *Voy. de l'Uranie. Zool. Part. II*,  
Poissons, p. 211, pl. 45, fig. 3-8.

= *Chaetodermis penicilligerus* (Cuvier, 1817).

- B. 2028. — Holotype figuré.  
Baie des Chiens Marins (Sud Australie). — QUOY et GAIMARD (1820).  
160 mm, alcool, mauvais état.  
« Ce baliste provient de la baie des Chiens Marins, à la Nouvelle-Hollande ; il a été assez facilement pris à la main par l'un de nous, à une très petite profondeur. »  
« Nous l'avons dédié à l'un des officiers de l'*Uranie* M. Alphonse Pellion, qui a rendu à l'expédition des services importants et de plus d'un genre... »
- Genre *Monacanthus* Cuvier, 1817.
- Balistes geographicus* Péron, in Cuvier = *Monacanthus geographicus* Cuvier, 1817, Règne animal, ed. I, pl. IX, fig. 2. — 1829, ed. II, T. II, p. 373 (en note 1).  
= *Monacanthus chinensis* (Osbeck, 1757).  
B. 2002. — Holotype figuré.  
Mers des Indes. — PÉRON et LESUEUR.  
143 mm, alcool, mauvais état.
- Monacanthus villosus* Cuvier, 1829, Règne animal, ed. II, T. II, p. 374 (en note 2 et 3).  
B. 2033, B. 2034. — Syntypes.  
Origine inconnue.  
70 et 71 mm, alcool, assez bon état.
- Monacanthus à deux filets*, *Monacanthus bifilamentosus* Lesson, 1830, Voyage autour du monde de la corvette *La Coquille*. Zool. T. II, p. 109, pl. 8.  
= *Monacanthus chinensis* (Osbeck, 1757).  
B. 2004. — Holotype figuré.  
Nouvelle-Guinée. — LESSON et GARNOT.  
205 mm, alcool, mauvais état.
- Monacanthus trichurus* Bleeker, 1853, Derde bijdrage ichthyol. fauna Amboina. *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* IV, p. 125.  
= *Monacanthus tomentosus* (Linné, 1758).  
3020. — Paratype.  
Amboine. — BLEEKER (1856).  
90 mm, alcool, bon état.
- Monacanthus komuki* Bleeker, 1853, Bijdrage ichthyol. fauna Japan. *Verhand. kon. Akad. Wetensch.* I, p. 13.  
= *Monacanthus tomentosus* (Linné, 1758).  
2018. — Paratype.  
Japon. — BLEEKER (1864).  
88 mm, alcool, bon état.
- Monacanthus macrocerus* Hollard, 1854, Monogr. Balistides. *Ann. Sc. Nat.*, 4<sup>e</sup> sér. T. II, p. 327, pl. 12, fig. 1.

- B. 1964. — Holotype figuré.  
Bahia. Musée de Genève.  
275 mm, alcool, assez bon état.

Genre *Amaneses* Gray, 1831.

*Balistes sandwichiensis* Quoy & Gaimard, 1824. Voy. *Uranie* et *Physicienne*. Zool. Part. II, Poissons, p. 214.

= *Amaneses sandwichiensis* (Quoy & Gaimard, 1824).

- a) B. 1959. — Holotype.

Iles Hawaï. — QUOY et GAIMARD (1820).

177 mm, alcool, mauvais état.

- B) 3058. — Paratype.

Nouvelle-Guinée. — QUOY et GAIMARD (1820).

87 mm, alcool, mauvais état.

*Monacanthus Ruppellii* Castelnau, 1843, Exp. Amérique du Sud. 7<sup>e</sup> part. Zool. Poissons. T. II, p. 97, pl. 47, fig. 2.

= *Amaneses sandwichiensis* (Quoy & Gaimard, 1824).

- B. 1960. — Holotype figuré.

Bahia. — CASTELNAU (1850).

160 mm, alcool, bon état.

*Monacanthus brunneus* Castelnau, 1873, Contribution to the Ichthyology of Australia. *Proc. Zool. Acclim. Soc. Victoria*, vol. II. VI. Notes on fishes from Knob Island, p. 108.

= *Amaneses sandwichiensis* (Quoy & Gaimard, 1824).

- B. 2046. — Holotype.

Noble-Island. — CASTELNAU.

82 mm, alcool, assez bon état.

*Thamnaconus penicularius* Fourmanoir, 1954, Ichth. et pêches Comores. *Mem. Inst. Sc. Madagascar*. A, T. IX, p. 230, fig. 18.

= *Amaneses hystrix* (Willughby, 1686) (Gray, 1831).

- 52-295. — Holotype figuré.

Mer Rouge. — Expédition de la « Calypso ».

124 mm, alcool, excellent état.

Genre *Pseudomonacanthus* Bleeker, 1865.

*Balistes verruculosus* Péron, dessin MSS. in MSS. CUVIER, Poissons Plectognathes (Monacanthes à papilles pédiculées), MSS n° 1754, Bibliothèque du Muséum de Paris.

= *Pseudomonacanthus papillosus* (Linné, 1758).

- B. 2014. — Holotype figuré.

Mers des Indes. — PÉRON et LESUEUR.

26 mm, alcool, bon état.

*Monacanthus vittiger* Castelnau, 1873. Contribution to the Ichthyology of Australia. *Proc. Zool. Acclim. Soc. Victoria*. Vol. II, n° IV, Fishes of South Australia, p. 81.

= *Pseudomonacanthus papillosus* (Linné, 1758).

B. 2051. — Holotype.

Adélaïde. — CASTELNAU (1877).

45 mm, alcool, bon état.

Genre *Acanthaluteres* Bleeker, 1865.

*Balistes spilomelanurus* Quoy & Gaimard, 1824, Voy. de l'*Uranie*. Zool. Part. II. Poissons, p. 217.

= *Acanthaluteres spilomelanurus* (Quoy & Gaimard, 1824).

a) B. 1973. — Holotype.

Port-Jackson (Australie). — QUOY et GAIMARD (1820).

107 mm, alcool, assez bon état.

b) B. 1978. — Paratype.

Baie de Jervis (Australie). — QUOY et GAIMARD (1820).

103 mm, alcool, mauvais état.

c) B. 1972, B. 1976. — Paratypes.

Australie. — QUOY et GAIMARD (1820).

107 mm, 145 mm, alcool, mauvais état.

le *Baliste pointillé*, *Balistes puncticulatus*, Quoy & Gaimard, dessin MSS. in MSS. CUVIER, Poissons Plectognathes (Monacanthes à fanon extensible, point d'épines à la queue), MSS. n° 1754, Bibliothèque du Muséum de Paris.

= *Acanthaluteres spilomelanurus* (Quoy & Gaimard, 1824).

B. 1975. — Holotype figuré.

Mers australes. — QUOY et GAIMARD.

75 mm, alcool, bon état.

*Baliste de Bailly* Quoy & Gaimard, MSS (Expédition Duperrey). Bibliothèque du Muséum de Paris.

= *Acanthaluteres spilomelanurus* (Quoy & Gaimard, 1824).

B. 1974. — Holotype.

Baie des Chiens Marins (Sud Australie). — QUOY et GAIMARD.

115 mm, alcool, mauvais état.

*Monacanthus lineo-guttatus* Hollard, 1854, Monogr. Balistides. Ann. Sc. Nat., 4<sup>e</sup> sér. T. II, p. 352.

= *Acanthaluteres Brownii* (Richardson, 1844).

A. 8479. — Holotype.

Port-Western. — QUOY et GAIMARD (1820).

320 mm, monté, bon état.

*Monacanthus Peroni* Hollard, 1854, Monogr. Balistides. Ann. Sc. Nat., 4<sup>e</sup> sér. T. II, p. 356, pl. 13, fig. 4.

= *Acanthaluteres Peroni* (Hollard, 1854).

B. 2020. — Holotype figuré.

Mers de l'Australie. — PÉRON et LESUEUR.

60 mm, alcool, bon état.

*Monacanthus Forsteri* Castelnau, 1872, Contribution to the Ichthyology of Australia. Proc. Zool. Soc. Victoria, vol. I, p. 204.

= *Acanthaluteres spilomelanurus* (Quoy & Gaimard, 1824).

B. 2044. — Paratypes.

Melbourne. — CASTELNAU (1875).

3 exempl., 68-76 mm, alcool, bon état.

*Monacanthus Lesueuri* Castelnau, 1873, Contribution to the Ichthyology of Australia. *Proc. Zool. Acclim. Soc. Victoria*, vol. II, n° III, Supplement to the fishes of Victoria, p. 56.

= *Acanthaluteres Peroni* (Hollard, 1854).

A. 4563. — Holotype.

Port-Western. — CASTELNAU (1882).

100 mm, naturalisé, mauvais état.

*Monacanthus Yagoi* Castelnau, 1878, Australian fishes. New or little known species. *Proc. Linn. Soc. New South Wales*, vol. 2, part. III, p. 245.

= *Acanthaluteres Brownii* (Richardson, 1844).

B. 2021. — Holotype.

Golfe Saint-Vincent (Sud Australie). — CASTELNAU (1877).

2 exempl., 192-244 mm, alcool, bon état.

Genre *Navodon* Whitley, 1935.

*Balistes hippocrepis* Quoy & Gaimard, 1824, Voy. de l'*Uranie*. Zool. Part. II, Poissons, p. 212.

= *Navodon hippocrepis* (Quoy & Gaimard, 1824).

B. 2015. — Holotype.

Ile Maurice. — QUOY et GAIMARD (1820).

305 mm, alcool, assez bon état.

*Balistes Ayraudi* Quoy & Gaimard, 1824, Voy. de l'*Uranie*. Zool. Part. II, Poissons, p. 216, pl. 47, fig. 2.

*Monacanthus platifrons* Hollard, 1854, Monogr. Balistides, *Ann. Sc. Nat.*, 4<sup>e</sup> sér. Zool. T. II, p. 341.

= *Navodon Ayraudi* (Quoy & Gaimard, 1824).

B. 2018. — Holotype figuré.

Australie (Baie du Roi Georges). — QUOY et GAIMARD (1820).  
225 mm, alcool, mauvais état.

« Le nom imposé à ce poisson rappelle une des nombreuses victimes de la fièvre jaune parmi les médecins de la marine. C'est dans la dernière épidémie que M. Ayraud est mort à la Martinique, après avoir vu un de ses frères, enseigne de vaisseau, succomber à la même maladie. » (QUOY et GAIMARD).

Genre *Oxymonacanthus* Bleeker, 1865.

*Monacanthus chrysoopilos* Bleeker, 1853, *Derde bijdr. ichth. Amboina. Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* IV, p. 126.

= *Oxymonacanthus longirostris* (Bl. Schneider, 1801).

3019. — Paratype.

Ile Batu. — BLEEKER (1856).

77 mm, alcool, bon état.

\* \*

Famille des ALUTERIDAE.

Genre *Brachaluteres* Bleeker, 1866.

*Monacanthus distortus* Castelnau, 1873, Contribution to the Ichthyology of Australia. *Proc. Zool. Acclim. Soc. Victoria*, vol. II, n° VIII, Fishes of Western Australia, p. 146.

= *Brachaluteres trossulus* (Richardson, 1844).

A. 4564. — Holotype.

Rivière des Cygnes. — CASTELNAU.

68 mm, naturalisé, mauvais état.

Genre *Alutera* (Cuvier), Oken, 1817.

*Aluteres personatus*, *Alutère à masque noir*, Lesson, 1830, *Voy. de la Coquille*. Zool. T. II, p. 105.

= *Alutera scripta* (Osbeck, 1757).

869. — Holotype.

Nouvelle-Guinée. — LESSON et GARNOT.

94 mm, alcool, mauvais état.

« Nous primes ce poisson, le 28 août 1823, par une belle journée de calme, sur les côtes de la Nouvelle-Guinée... L'alutère à masque noir nageait en pleine mer au milieu d'arbres déracinés, de plantes marines que transportait un courant que nous traversâmes, en compagnies de lophies, de tortues, de vers marins... » (LESSON).

*Aluteres pareva* Lesson, 1830, *Voy. de la Coquille*. Zool. T. II, p. 106.

*Aluterus venosus* Hollard 1855, *Monogr. Balistides. Ann. Sc. Nat.*, 4<sup>e</sup> sér., Zool., t. IV, p. 14, pl. 1, fig. 3.

= *Alutera scripta* (Osbeck, 1753).

B. 1970. — Holotype figuré.

Nouvelle-Irlande. — LESSON et GARNOT.

168 mm, alcool, assez bon état.

*Aluteres pareva* Lesson, 1830, *Voy. de la Coquille*, Zool, T. II, p. 106.

= *Alutera scripta* (Osbeck, 1757).

A. 8475. — Paratype.

Ile de l'Ascension. — LESSON et GARNOT.

420 mm, monté, assez bon état.

*Aluteres Berardi*, *Alutère de Bérard*, Lesson, 1830, *Voy. de la Coquille*, Zool., T. II, p. 108, pl. 7.

= *Alutera monoceros* (Osbeck, 1757).

B. 1949. — Holotype figuré.

Nouvelle-Guinée. — LESSON et GAGNOT.

210 mm, alcool, assez bon état.

« Cet alutère dont le nom est celui de M. Bérard, un des officiers de l'expédition, qui a beaucoup enrichi nos collections d'histoire naturelle, vit dans les mers qui baignent la Nouvelle-Guinée. » (LESSON).

- Aluterus Holbroocki* Hollard, 1855, Monogr. Balistides. *Ann. Sc. Nat.*,  
4<sup>e</sup> sér., T. IV, p. 7.  
= *Alutera Schoepfi* (Walbaum, 1792).  
B. 1952. — Holotype.  
Charleston. — HOLBROOCK.  
120 mm, alcool, mauvais état.
- Aluterus cultrifrons* Hollard, 1853, Monogr. Balistides. *Ann. Soc. Nat.*,  
4<sup>e</sup> sér. T. IV, p. 8, pl. 1, fig. 2.  
= *Alutera Schoepfi* (Walbaum, 1792).  
a) B. 1944. — Holotype figuré.  
Bahia. — Musée de Genève.  
420 mm, alcool, assez bon état.  
b) B. 1945. — Paratype.  
New-York. — MILBERT.  
400 mm, alcool, assez bon état.  
c) B. 1943. — Paratype.  
Bahia. — CASTELNAU (1850).  
350 mm, alcool, assez bon état.  
d) B. 1946. — Paratype.  
New-York.  
290 mm, alcool, mauvais état.
- Aluterus anginosus*, Hollard, 1855, Monogr. Balistides, *Ann. Sc. Nat.*,  
4<sup>e</sup> sér. Zool. T. IV, p. 11.  
= *Alutera monoceros* (Osbeck, 1757).  
a) B. 1950. — Syntype.  
Mers des Indes. — Voyage de la *Zélée*.  
150 mm, alcool, assez bon état.  
b) A. 8476. — Syntype.  
Pondichéry. — LESCHENAULT.  
540 mm, monté, assez bon état.  
c) A. 8477. — Syntype.  
Mers des Indes.  
450 mm, monté, assez bon état.
- Aluterus Heudeloti* Hollard, 1855, Monogr. Balistides. *Ann. Sc. Nat.*,  
4<sup>e</sup> sér. Zool. T. IV, p. 13.  
B. 1947. — Holotype.  
Sénégal. — HEUDELLOT (1834).  
116 mm, alcool, assez bon état.

Genre *Pseudaluteres* Bleeker, 1865.

- Aluterus rhinoceros* Hollard, 1855, Monogr. Balistides. *Ann. Sc. Nat.*,  
4<sup>e</sup> sér. Zool. T. IV, p. 19, pl. 1, fig. 4.  
= *Pseudaluteres nasicornis* (Temminck & Schlegel, 1842).  
B. 2031. — Holotype figuré.  
Mers des Indes. — DUSSUMIER (1830).  
47 mm, alcool, bon état.